

Nemasys – mot harkrankslarver

Använd Nemasys för att ta hand om harkrankslarver i gräsmattan och större gräsytor genom att använda nematoder som är naturliga fiender mot harkrankslarverna.



J F M A M J J **A S O** N D

Bästa tiden för behandling är augusti till oktober. Behandla två veckor efter att de första vuxna harkrankarna varit synliga.

Behandla när harkrankslarven är aktiv i marken, vilket normalt inträffar augusti fram till slutet oktober. Vid kraftiga angrepp kan man behöva behandla i april/maj, då måste dosen vara dubbel, stora larver kräver en högre mängd nematoder för att uppnå ett tillfredställande resultat. Upprepa behandling i september med normal mängd nematoder.

När du börjar se vuxna harkrankarna sitta på gräset under slutet juli och augusti vet du att inom några dagar börjar de lägga ägg. Dessa kläcks ganska kort tid efter, beräkna att första behandlingen görs två veckor efter att du noterat de första vuxna harkrankarna flyga omkring.

Behandla fuktig jord när temperaturen i marken är över +12°C. Genomvattning eller 3 – 5 mm regn efter behandling hjälper nematoderna att komma ned till rotsystem där harkrankslarvema finns. Se till att gräsytan hålls fuktig under minst två veckor efter behandling, nematoderna kräver fuktig jord för att fungera optimalt.

Nemasys nematoden (*Steinernema feltiae*), söker upp harkrankslarven och attackerar den genom naturliga öppningar. Inne i larven frigör nematoden en bakterie som bekämpar larven. Nematoderna reproducerar sig inne i larven och nya nematoder söker efter nya larver.

Nemasys finns i två storlekar, 50 och 250 miljoner, dosering 0,15 miljoner/m² vid höst **behandling**. och 0,3 miljoner/m² vid vår**behandling**